

LIMITES ET INTÉGRALES

1. Limites de suites d'intégrales

- 1** **Wallis** Démontrer que la suite de terme général $\int_0^{\pi/2} \sin^n t dt$ converge, donner sa limite en appliquant un théorème puis en effectuant un découpage.

Solution de 1 : Wallis

Définissons

$$f_n : \begin{cases}]0, \pi/2[& \longrightarrow \mathbb{R} \\ t & \longmapsto \sin^n t \end{cases}$$

La suite (f_n) converge simplement vers $\tilde{0}$. L'hypothèse de domination est facile à réaliser :

$$\forall n \geq 0 \quad \forall t \in]0, \pi/2[\quad |\sin^n t| \leq 1$$

Or la fonction $t \mapsto 1$ est indépendante de n , et intégrable sur $]0, \pi/2[$.

Les fonctions f_n et la fonction $\tilde{0}$ sont continues par morceaux, on peut alors appliquer le théorème de convergence dominée :

$$\int_0^{\pi/2} f_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\pi/2} 0 = 0$$

2 Utilité de l'hypothèse de domination

Définissons, sur $[0, 1]$, f_n continue affine par morceaux nulle en 0 et sur $\left[\frac{1}{n+1}, 1\right]$, et prenant en $\frac{1}{n+1}$ la valeur $n+1$.

Étudier la convergence simple de (f_n) et la convergence de $\left(\int_{[0,1]} f_n\right)_{n \in \mathbb{N}}$.

3 CCINP 25

- Démontrer que, pour tout entier naturel n , la fonction $t \mapsto \frac{1}{1+t^2+t^n e^{-t}}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, pose $u_n = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2+t^n e^{-t}}$. Calculer la limite de (u_n) .

Solution de 3 : CCINP 25

- $f_n : t \mapsto \frac{1}{1+t^2+t^n e^{-t}}$ est définie et continue par morceaux sur $[0, +\infty[$.

De plus, $\forall t \in [0, +\infty[$, $|f_n(t)| \leq \frac{1}{1+t^2} = \varphi(t)$.

Or $\varphi(t) \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{t^2}$ et $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ est intégrable sur $[1, +\infty[$, donc φ est intégrable sur $[1, +\infty[$.

Donc, par critère de majoration pour les fonctions positives, f_n est intégrable sur $[1, +\infty[$.

Or f_n est continue sur $[0, 1]$ donc f_n est intégrable sur $[0, +\infty[$.

2. i) La suite de fonctions (f_n) converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers la fonction f définie par : $f(t) = \begin{cases} \frac{1}{1+t^2} & \text{si } t \in]0, +\infty[\\ \frac{1}{2+e^{-1}} & \text{si } t = 0 \end{cases}$

ii) Les fonctions f_n et f sont continues par morceaux sur $[0, +\infty[$.

iii) $\forall t \in [0, +\infty[, |f_n(t)| \leq \varphi(t)$ avec φ intégrable sur $[0, +\infty[$.

Alors, d'après le théorème de convergence dominée, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(t) dt = \int_0^{+\infty} f(t) dt$.

$$\text{Or } \int_0^{+\infty} f(t) dt = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{4}.$$

$$\text{Donc, } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{\pi}{4}.$$

4 CCINP 26 Pour tout entier $n \geq 1$, on pose $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+t^2)^n} dt$.

1. Justifier que I_n est bien définie.
2. (a) Étudier la monotonie de la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.
(b) Déterminer la limite de la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.
3. La série $\sum_{n \geq 1} (-1)^n I_n$ est-elle convergente?

Solution de 4 : CCINP 26

Posons pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $t \in [0, +\infty[$, $f_n(t) = \frac{1}{(1+t^2)^n}$.

1. $\forall n \in \mathbb{N}^*$, f_n est continue sur $[0, +\infty[$.

De plus, $|f_n(t)| \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{t^{2n}}$.

Or $n \geq 1$, alors $t \mapsto \frac{1}{t^{2n}}$ est intégrable sur $[1, +\infty[$.

Donc, par règle d'équivalence pour les fonctions positives, f_n est intégrable sur $[1, +\infty[$.

Or f_n est continue sur $[0, 1]$, donc f_n est intégrable sur $[0, +\infty[$.

2. (a) $\forall t \in [0, +\infty[, \frac{1}{(1+t^2)^{n+1}} \leq \frac{1}{(1+t^2)^n}$ car $1+t^2 \geq 1$.

En intégrant, on obtient : $\forall n \in \mathbb{N}^*, I_{n+1} \leq I_n$.

Donc $(I_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est décroissante.

- (b) Remarque : $(I_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est décroissante et clairement positive ce qui nous assure la convergence de la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

Déterminons la limite de la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

i) $\forall n \in \mathbb{N}^*$, f_n est continue par morceaux sur $[0, +\infty[$.

ii) La suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers la fonction f définie sur

$$[0, +\infty[\text{ par } f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x > 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}.$$

De plus, f est continue par morceaux sur $[0, +\infty[$.

iii) $\forall t \in [0, +\infty[, \forall n \in \mathbb{N}^*, |f_n(t)| \leq \frac{1}{1+t^2} = \varphi(t)$ avec φ intégrable sur $[0, +\infty[$.

En effet φ est continue sur $[0, +\infty[$ et $\varphi(t) \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{t^2}$. Comme $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ est intégrable sur $[1, +\infty[$, donc φ est intégrable sur $[1, +\infty[$. Comme φ est continue sur $[0, 1]$, donc φ est intégrable sur $[0, 1]$ donc

sur $[0, +\infty[$.

Par le théorème de convergence dominée on obtient :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(t) dt = \int_0^{+\infty} f(t) dt = 0$$

et la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ a pour limite 0.

3. D'après les questions précédentes, la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est positive, décroissante et converge vers 0. Donc, par application du théorème spécial des séries alternées, on peut affirmer la convergence de la série $\sum_{n \geq 1} (-1)^n I_n$.

5 CCINP 27 Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $f_n(x) = \frac{e^{-x}}{1+n^2x^2}$ et $u_n = \int_0^1 f_n(x) dx$.

1. Étudier la convergence simple de la suite de fonctions (f_n) sur $[0, 1]$.
2. Soit $a \in]0, 1[$. La suite de fonctions (f_n) converge-t-elle uniformément sur $[a, 1]$?
3. La suite de fonctions (f_n) converge-t-elle uniformément sur $[0, 1]$?
4. Trouver la limite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

Solution de 5 : CCINP 27

1. Soit $x \in [0, 1]$.

Si $x = 0$, $f_n(0) = 1$.

Si $x \in]0, 1]$, pour n au voisinage de $+\infty$, $f_n(x) \underset{+\infty}{\sim} \frac{e^{-x}}{x^2} \frac{1}{n^2}$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$.

On en déduit que la suite de fonctions (f_n) converge simplement sur $[0, 1]$ vers la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in]0, 1] \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

2. Soit $a \in]0, 1[$.

$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in [a, 1], |f_n(x) - f(x)| = f_n(x) \leq \frac{e^{-a}}{1+n^2a^2}$ (majoration indépendante de x).

Donc $\sup_{t \in [a, 1]} |f_n(t) - f(t)| \leq \frac{e^{-a}}{1+n^2a^2}$.

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{-a}}{1+n^2a^2} = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{t \in [a, 1]} |f_n(t) - f(t)| = 0$

On en déduit que (f_n) converge uniformément vers f sur $[a, 1]$.

3. Les fonctions f_n étant continues sur $[0, 1]$ et la limite simple f ne l'étant pas, on peut assurer qu'il n'y a pas convergence uniforme sur $[0, 1]$.
4. i) Les fonctions f_n sont continues par morceaux sur $[0, 1]$.
ii) (f_n) converge simplement vers f sur $[0, 1]$, continue par morceaux sur $[0, 1]$.
iii) De plus, $\forall x \in [0, 1], |f_n(x)| \leq e^{-x} \leq 1 = \varphi(x)$ avec $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^+$ continue par morceaux et intégrable sur $[0, 1]$.

D'après le théorème de convergence dominée, on peut donc affirmer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 f(x) dx = 0.$$

6 Calcul de limite d'une transformée de Laplace

Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t^2} dt$ a une limite quand $x \rightarrow +\infty$; la calculer.

Solution de 6 : Calcul de limite d'une transformée de Laplace

Domination par $\frac{1}{1+t^2}$, limite nulle.

7 Théorèmes de la valeur initiale et de la valeur finale

Soit f une fonction continue sur $[0, +\infty[$, ayant une limite (finie) en $+\infty$. On sait alors qu'elle est bornée.

On définit, si $x > 0$, $F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt} f(t) dt$. Montrer que $xF(x)$ a des limites en 0 et en $+\infty$, les calculer.

Solution de 7 : Théorèmes de la valeur initiale et de la valeur finale

Changement de variable $u = st$.

8 Utilisation pour le calcul d'une intégrale semi-convergente

Montrer que l'intégrale généralisée $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ converge.

On définit, si $x \geq 0$, $F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt} \frac{\sin t}{t} dt$.

Calculer la limite de F en $+\infty$.

Puis montrer que $F(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} F(0)$, autrement dit que F est continue en 0.

On pourra utiliser la fonction $g: x \rightarrow \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$ et l'exercice précédent.

9 CCINP 50 On considère la fonction $F: x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^{-2t}}{x+t} dt$.

1. Prouver que F est définie et continue sur $]0; +\infty[$.
2. Prouver que $x \mapsto xF(x)$ admet une limite en $+\infty$ et déterminer la valeur de cette limite.
3. Déterminer un équivalent, au voisinage de $+\infty$, de $F(x)$.

Solution de 9 : CCINP 50

1.

$$2. \forall x \in]0; +\infty[, xF(x) = \int_0^{+\infty} \frac{x}{x+t} e^{-2t} dt.$$

Posons $\forall x \in]0; +\infty[, \forall t \in [0; +\infty[, h_x(t) = \frac{x}{x+t} e^{-2t}$.

i) $\forall x \in]0; +\infty[, t \mapsto h_x(t)$ est continue par morceaux sur $[0, +\infty[$.

ii) $\forall t \in [0; +\infty[, \lim_{x \rightarrow +\infty} h_x(t) = e^{-2t}$.

La fonction $h: t \mapsto e^{-2t}$ est continue par morceaux sur $[0; +\infty[$.

iii) $\forall x \in]0; +\infty[, \forall t \in [0; +\infty[, |h_x(t)| \leq e^{-2t}$ et $t \mapsto e^{-2t}$ est continue par morceaux, positive et intégrable sur $[0; +\infty[$.

Donc, d'après l'extension du théorème de convergence dominée à $(h_x)_{x \in]0; +\infty[}$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} h_x(t) dt = \int_0^{+\infty} h(t) dt = \int_0^{+\infty} e^{-2t} dt = \frac{1}{2}.$$

Conclusion : $\lim_{x \rightarrow +\infty} xF(x) = \frac{1}{2}$.

3. D'après 2., $\lim_{x \rightarrow +\infty} xF(x) = \frac{1}{2}$, donc $F(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2x}$.

10 On pose $I_n = \int_0^1 \frac{du}{1+u^n}$ pour $n \in \mathbb{N}$. Démontrer que la suite (I_n) converge vers une limite ℓ , et trouver un équivalent de $I_n - \ell$.

Solution de 10 :

Par théorème de convergence dominée, fonction dominante : $\tilde{1}$, on trouve une limite égale à 1. Ensuite, première technique : si on veut comparer une intégrale à un nombre, on écrit ce nombre sous forme d'intégrale. Ici

$$1 - I_n = \int_0^1 \frac{u^n}{1+u^n} du$$

Puis, technique habituelle pour ce genre d'exercice (qu'on rencontre à l'oral), on fait un changement de variable : $t = u^n$, ou plutôt $u = t^{1/n}$. Ce qui fait sortir un $1/n$. En facteur d'une intégrale à laquelle il est facile d'appliquer le théorème de convergence dominée (encore la fonction dominante $\tilde{1}$). On trouve l'équivalent

$$\frac{\ln 2}{n}$$

11 Soit f réelle continue sur $[0, 1]$. Montrer que la suite de terme général $n \int_0^1 t^n f(t) dt$ admet pour limite $f(1)$.

Solution de 11 :

Changement de variable $t^n = u$, ou plutôt $t = u^{1/n}$. Fonction dominante, par exemple : $\widetilde{N_\infty(f)}$.

12 Déterminer, si elle existe, la limite de la suite de terme général $\int_0^1 \frac{f(t)}{1+nt} dt$ où f est une fonction continue sur le segment $[0, 1]$.

Solution de 12 :

Limite nulle... Fonction dominante $|f|$ par exemple.

13 Soit f continue sur $[0, 1]$.

1. Déterminer la limite ℓ quand n tend vers l'infini de $\int_0^1 \frac{f(t^n)}{1+t} dt$

2. On suppose f dérivable en 0 telle que $\int_0^1 \frac{f(u) - f(0)}{u} du \neq 0$.

Déterminer un équivalent de $\int_0^1 \frac{f(t^n)}{1+t} dt - \ell$

Solution de 13 :

La limite est $\ln 2 f(0)$ (théorème de convergence dominée, fonction dominante, par exemple $\widetilde{N_\infty(f)}$). Puis (remarquons que la limite s'écrit sous forme d'une intégrale, forme à laquelle il faut évidemment revenir)

$$\int_0^1 \frac{f(t^n)}{1+t} dt - \ell = \int_0^1 \frac{f(t^n) - f(0)}{1+t} dt$$

Le changement de variable habituel dans ce genre d'exercice : $u = t^n$, ou plutôt $t = u^{1/n}$.

$$\int_0^1 \frac{f(t^n)}{1+t} dt - \ell = \frac{1}{n} \int_0^1 \frac{f(u) - f(0)}{u} \frac{u^{1/n}}{1+u^{1/n}} du$$

La fonction $g : u \mapsto \frac{f(u) - f(0)}{u}$ se prolonge à $[0, 1]$ en restant continue. On en déduit, par théorème de convergence dominée (domination par exemple par $\widetilde{N_\infty(g)}$) qu'un équivalent est

$$\frac{1}{2n} \int_0^1 \frac{f(u) - f(0)}{u} du$$

sous réserve que cette intégrale soit non nulle.

14 Oral Mines-Centrale Soit f continue sur $[0, 1]$, à valeurs réelles. Etudier la convergence de la suite de terme général $\int_0^1 f(t^n) dt$.

Solution de 14 : Oral Mines-Centrale

Théorème de convergence dominée, domination par exemple par $\widetilde{N_\infty(f)}$. La limite est $f(0)$.

15 Oral Mines Étudier la limite de la suite de terme général $\int_0^{+\infty} \exp(-t^n) dt$.

Solution de 15 : Oral Mines

Domination par la fonction $t \mapsto 1$ si $0 < t < 1$, $\exp(-t)$ si $t \geq 1$ (il faut avoir une fonction dominante intégrable...), la convergence simple s'étudie en distinguant les cas $t < 1$, $t = 1$, $t > 1$. La limite est 1.

16 Trouver un équivalent quand $n \rightarrow +\infty$ de $\int_0^1 \frac{t^n}{\sqrt{1+t^n}} dt$.

Solution de 16 :

On pourrait espérer une limite, mais si le TCVD s'applique, cette limite va être nulle. On fait un changement de variable $t^n = u$, $t = u^{1/n}$. On obtient

$$I_n = \frac{1}{n} \int_0^1 \frac{u^{1/n}}{\sqrt{1+u}} du$$

La domination

$$\forall u \in [0; 1] \quad \left| \frac{u^{1/n}}{\sqrt{1+u}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{1+u}}$$

(ou ≤ 1 , tout simplement) permet d'appliquer le théorème de convergence dominée pour obtenir

$$\int_0^1 \frac{u^{1/n}}{\sqrt{1+u}} du \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+u}} du$$

D'où l'équivalent :

$$\frac{2(\sqrt{2}-1)}{n}$$

17 Pour tout entier naturel non nul n , on définit $I_n = \int_0^n \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \ln x dx$.

Démontrer que la suite (I_n) converge vers une limite que l'on exprimera sous forme intégrale.

Solution de 17 :

On peut montrer l'existence de l'intégrale pour commencer.

Puis on considère $\phi_n : x \mapsto \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \ln x \mathbf{1}_{]0, n[}(x)$. La suite (ϕ_n) converge simplement sur $]0, +\infty[$ vers $x \mapsto e^{-x} \ln x$. Et on montre, à l'aide de l'inégalité classique $\ln(1+u) \leq u$, que la suite (ϕ_n) est dominée par sa limite, limite qui est intégrable (on fait des études sur $]0, 1]$ et sur $[1, +\infty[$, et on compare à l'exemple de Riemann dans chacun des cas).

18 **Oral CCINP** Soit $[\alpha, \beta]$ un segment réel; soient (a_n) et (b_n) des suites telles que, pour tout n , $\alpha \leq a_n \leq b_n \leq \beta$ et (a_n) tend vers α , (b_n) tend vers β . Soit (f_n) une suite de fonctions réelles continues sur $[\alpha, \beta]$ convergeant uniformément vers une certaine fonction f .

1. Etudier la convergence de la suite de terme général $\int_{a_n}^{b_n} f_n(t) dt$.
2. Soit $g : [1, e] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Montrer que la suite de terme général $n \int_1^{1+1/n} g(t^n) dt$ converge vers $\int_1^e \frac{g(s)}{s} ds$.

Solution de 18 : Oral CCINP

Pour la première question, la limite est $\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt$, on peut montrer que la différence tend vers 0 grâce à la majoration obtenue par découpage :

$$\left| \int_{a_n}^{b_n} f_n(t) dt - \int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt \right| \leq (b_n - a_n) \|f_n - f\|_{\infty} + \|f\|_{\infty} (\beta - b_n + a_n - \alpha)$$

On peut aussi utiliser le théorème de convergence dominée en introduisant la fonction indicatrice de $[\alpha_n, \beta_n]$ mais c'est plus sophistiqué. Pour la deuxième question on fait le changement de variable $u = t^n$, $t = u^{1/n}$, on aboutit à

$$\int_1^{1+1/n} g(t^n) dt = \frac{1}{n} \int_1^{\beta_n} \frac{u^{1/n} g(u)}{u} du$$

et on utilise la première question.

2. Interversions séries-intégrales

19 Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t - 1} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

20 On suppose que (a_n) est une suite de nombres complexes telle que $\sum |a_n|$ converge. On définit, sur \mathbb{R} ,

$$f : t \mapsto \sum_{p=1}^{+\infty} a_p \sin(pt).$$

Montrer que, pour tout $m \in \mathbb{N}_*$, $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(mt) f(t) dt = a_m$.

21 Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + e^t} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$.

22 **CCINP 19**

1. Prouver que, pour tout entier naturel n , $f_n : t \mapsto t^n \ln t$ est intégrable sur $]0, 1]$ et calculer $I_n = \int_0^1 t^n \ln t dt$.

2. Prouver que $f : t \mapsto e^t \ln t$ est intégrable sur $]0, 1]$ et que $\int_0^1 e^t \ln t dt = - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{nn!}$.

Solution de 22 : CCINP 19

1. On pose, pour tout entier naturel n , pour tout $t \in]0, 1]$, $f_n(t) = t^n \ln t$.
 Pour tout entier naturel n , f_n est continue par morceaux sur $]0, 1]$.

On a $t^{\frac{1}{2}} |f_n(t)| \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0$ donc, au voisinage de 0, $|f_n(t)| = o\left(\frac{1}{t^{\frac{1}{2}}}\right)$.

Or, $t \mapsto \frac{1}{t^{\frac{1}{2}}}$ est intégrable sur $]0, 1]$ (fonction de Riemann intégrable).

Donc f_n est intégrable sur $]0, 1]$.

De plus, pour $x \in]0, 1]$, par intégration par parties :

$$\int_x^1 t^n \ln t dt = \left[\frac{t^{n+1} \ln t}{n+1} \right]_x^1 - \int_x^1 \frac{t^n}{n+1} dt = -\frac{x^{n+1} \ln x}{n+1} - \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2}.$$

On en déduit, en faisant tendre x vers 0, que $I_n = -\frac{1}{(n+1)^2}$.

2. $\forall t \in \mathbb{R}, e^t = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n}{n!}$ donc, pour tout $t \in]0, 1]$, $f(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n \ln t}{n!}$.

On pose : $\forall n \in \mathbb{N}, \forall t \in]0, 1]$, $g_n(t) = \frac{t^n \ln t}{n!}$.

i) $\forall n \in \mathbb{N}$, g_n est continue par morceaux et intégrable sur $]0, 1]$ d'après la question 1.

ii) $\sum g_n$ converge simplement sur $]0, 1]$ et a pour somme f .

iii) f est continue par morceaux sur $]0, 1]$.

iv) $\sum \int_0^1 |g_n(t)| dt = \sum \int_0^1 \frac{-t^n \ln t}{n!} dt = \sum \frac{-I_n}{n!} = \sum \frac{1}{(n+1)^2 n!}$.

On a : $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq \frac{1}{(n+1)^2 n!} \leq \frac{1}{(n+1)^2}$.

De plus, $\sum \frac{1}{(n+1)^2} = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ converge.

Donc, par critère de majoration des séries à termes positifs, $\sum \frac{1}{(n+1)^2 n!}$ converge.

Alors, d'après le théorème d'intégration terme à terme pour les séries de fonctions,

f est intégrable sur $]0, 1]$ et on a :

$$\int_0^1 e^t \ln t dt = \int_0^1 \sum_{n=0}^{+\infty} g_n(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 \frac{t^n \ln t}{n!} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{I_n}{n!} = -\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!(n+1)^2} = -\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)!(n+1)}.$$

C'est-à-dire, $\int_0^1 e^t \ln t dt = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{nn!}$.

23 CCINP 49

Soit $\sum a_n$ une série absolument convergente à termes complexes. On pose $M = \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|$.

On pose : $\forall n \in \mathbb{N}, \forall t \in [0, +\infty[, f_n(t) = \frac{a_n t^n}{n!} e^{-t}$.

1. (a) Justifier que la suite (a_n) est bornée.
- (b) Justifier que la série de fonctions $\sum f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$.

On admettra, pour la suite de l'exercice, que $f : t \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t)$ est continue sur $[0, +\infty[$.

2. (a) Justifier que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction $g_n : t \mapsto t^n e^{-t}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ et calculer $\int_0^{+\infty} g_n(t) dt$.

En déduire la convergence et la valeur de $\int_0^{+\infty} |f_n(t)| dt$.

- (b) Prouver que $\int_0^{+\infty} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n t^n}{n!} e^{-t} \right) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n$.

Solution de 23 : CCINP 49

1. Rappelons que, $\forall x \in \mathbb{R}, \sum \frac{x^n}{n!}$ converge ($\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$).

- (a) $\sum a_n$ converge absolument, donc converge simplement; donc la suite (a_n) converge vers 0 et donc elle est bornée.

Autre méthode : On remarque que $\forall n \in \mathbb{N} |a_n| \leq M = \sum_{p=0}^{+\infty} |a_p|$.

- (b) La suite (a_n) est bornée donc $\exists K \in \mathbb{R}^+ / \forall n \in \mathbb{N}, |a_n| \leq K$.

Soit $t \in [0, +\infty[$.

On a : $\forall n \in \mathbb{N}, |f_n(t)| \leq K \frac{t^n}{n!}$. Or la série $\sum \frac{t^n}{n!}$ converge, donc $\sum f_n(t)$ converge absolument, donc converge.

On a donc vérifié la convergence simple de $\sum f_n$ sur $[0, +\infty[$.

2. (a) $\forall n \in \mathbb{N}, g_n$ est continue sur $[0, +\infty[$.

De plus, $\lim_{t \rightarrow +\infty} t^2 g_n(t) = 0$, donc, au voisinage de $+\infty, g_n(t) = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$.

Or $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ est intégrable sur $[1, +\infty[$, donc g_n est intégrable sur $[1, +\infty[$, donc sur $[0, +\infty[$.

On pose alors : $\forall n \in \mathbb{N}, I_n = \int_0^{+\infty} g_n(t) dt$.

En effectuant une intégration par parties, on prouve que $I_n = n I_{n-1}$.

On en déduit par récurrence que $I_n = n! I_0 = n!$.

Alors $t \mapsto |f_n(t)|$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ car $|f_n(t)| = \frac{|a_n|}{n!} g_n(t)$.

Et on a $\int_0^{+\infty} |f_n(t)| dt = \frac{|a_n|}{n!} n! = |a_n|$.

- (b) i) $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ est continue par morceaux et intégrable sur $[0, +\infty[$ d'après la question 2.(a)

ii) $\sum f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$ et a pour somme $f = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ d'après 1.(b).

iii) f est continue par morceaux sur $[0, +\infty[$ car continue sur $[0, +\infty[$ d'après la question 1.(b) (admis)

iv) $\sum \int_0^{+\infty} |f_n(t)| dt = \sum |a_n|$ et $\sum |a_n|$ converge par hypothèse, donc $\sum \int_0^{+\infty} |f_n(t)| dt$ converge. Alors, d'après le théorème d'intégration terme à terme pour les séries de fonctions, f est intégrable sur $[0, +\infty[$ et on a :

$$\int_0^{+\infty} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n t^n}{n!} e^{-t} \right) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{+\infty} \frac{a_n t^n}{n!} e^{-t} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n!} \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n!} n! = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n.$$

24 Montrer, en utilisant des séries géométriques, que

$$1. \int_0^1 \frac{\ln^2 t}{1+t^2} dt = 2 \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}. \quad 2. \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{e^t - 1} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + 1}. \quad 3. \int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{t-1} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n^2}.$$

Solution de 24 :

1. Théorème d'inversion N_1 , pas de problème pour vérifier les hypothèses, le calcul de la norme N_1 se fait par double IPP, elle vaut $\frac{2}{(2n+1)^3}$ (comme on s'y attend).
2. On factorise par e^{-t} , puis théorème d'inversion N_1 , pour la convergence de $N_1(f_n)$, utiliser l'inégalité classique $|\sin t| \leq |t|$ puis intégrer par partie. Intégrer après interversion avec $\sin t = \Im(e^{it})$.
3. Inversion N_1 , l'intégrale de la norme N_1 se calcule par partie, on trouve $\frac{1}{(n+1)^2}$. Le reste est facile.

25 **Oral Mines** Soit $I_n = \int_0^1 \frac{t^n \ln t}{t^2 - 1} dt$. Calculer la limite de I_n , puis un équivalent de I_n .

Solution de 25 : Oral Mines

$$\text{Soit } f_n : t \in]0, 1[\rightarrow \frac{t^n \ln t}{t^2 - 1}.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est continue sur $]0, 1[$, et (f_n) converge simplement vers la fonction nulle sur $]0, 1[$ qui est continue.

De plus, si $n \in \mathbb{N}$ et $t \in]0, 1[$, $|f_n(t)| \leq \phi(t) = \frac{\ln t}{t^2 - 1}$ avec $\phi :]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}^+$ continue, positive, intégrable sur $]0, 1/2[$ car négligeable devant $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{t}}$ au voisinage de 0 et intégrable sur $]1/2, 1[$ car au voisinage de 1,

$$\phi(t) \sim \frac{t-1}{2(t-1)} = \frac{1}{2} \text{ donc prolongeable par continuité.}$$

Par théorème de convergence dominée, I_n existe et $I_n \rightarrow 0$.

$$\text{Puis, en fixant un } n, I_n = - \int_0^1 t^n \ln t \sum_{k=0}^{+\infty} t^{2k} dt = - \int_0^1 \sum_{k=0}^{+\infty} t^{2k+n} (-\ln t) dt.$$

On pose $g_k : t \in]0, 1[\mapsto t^{2k+n} (-\ln t)$ intégrable sur $]0, 1[$ avec des arguments similaires à ϕ ci-dessus.

De plus, avec ce qui précède, $\sum g_k$ converge simplement vers $t \mapsto f_n(t)$ qui est continue sur $]0, 1[$.

$$\text{Enfin, } \int_0^1 |g_k(t)| dt = \int_0^1 g_k(t) dt = - \int_0^1 t^{2k+n} \ln t dt \text{ qui se calcule en intégrant par partie (prudemment) :}$$

on trouve $\frac{1}{(2k+n+1)^2} \underset{k \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{4k^2}$ terme général positif de série convergente (par rapport à k).

Le théorème d'inversion d'applique, tout converge et on peut écrire

$$I_n = \sum_{k=0}^{+\infty} \int_0^1 g_k(t) dt = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+n+1)^2}$$

On effectue alors une comparaison série intégrale, à n fixé, avec $t \mapsto \frac{n}{(2t+n+1)^2}$ décroissante sur \mathbb{R}^+ . On obtient

$$J_n \leq I_n \leq J_n + \frac{1}{(n+1)^2}$$

où $J_n = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(2t+n+1)^2} dt = \left[\frac{-1/2}{2t+n+1} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{2(n+1)}$ d'où $I_n \sim \frac{1}{2n}$ ce qui redonne bien la limite nulle.

26 Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $f_n : x \mapsto \frac{x^{2n+1} \ln x}{x^2 - 1}$.

1. Montrer que f_n est intégrable sur $]0, 1[$.

On note $J_n = \int_0^1 f_n(t) dt$.

2. Déterminer la limite de $(J_n)_n$.

3. Montrer que $J_n = \frac{1}{4} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$.

Solution de 26 :

Similaire au 25.

27 1. Pour $a > 0$ et $b > 0$, montrer que $\int_0^1 \frac{t^{a-1}}{1+t^b} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{a+nb}$.

2. Calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1}$.

Solution de 27 :

1. On fait apparaître une série géométrique, on trouve $f_n : t \mapsto (-1)^n t^{a+nb-1}$.

Le théorème de convergence N_1 ne s'applique pas ici car $N_1(f_n) = \frac{1}{a+nb}$.

Il faut donc y aller « à la main ». Comme on sait calculer les sommes partielles d'une série géométrique, on peut appliquer le TCVD à la suite des sommes partielles

$$S_n(t) = \sum_{k=0}^n f_k(t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{t^{a-1}}{1+t^b} \text{ sur }]0, 1[.$$

Les hypothèses se vérifient facilement et on peut majorer avec $|S_n(t)| \leq \frac{2t^{a-1}}{1+t^b}$.

Le passage à la limite sous l'intégrale permet de conclure.

2. On décompose en éléments simples en factorisant $t^3 + 1 = (t+1)(t^2 - t + 1)$ et on intègre patiemment.

On trouve $\frac{\ln 2}{3} + \frac{\pi}{2\sqrt{3}}$.

