

## FONCTIONS VECTORIELLES : DÉRIVABILITÉ

### Vrai ou faux

1. Une fonction dérivable à droite et à gauche en un point est dérivable en ce point.
2. Si  $f$  est dérivable à valeur dans  $E$  de dimension finie,  $\|f\|$  est dérivable en tout point tel que  $f(x) \neq 0$ .
3. Pour toute fonction dérivable sur  $[a, b]$ , il existe  $c \in [a, b]$  tel que  $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$ .
4. Si  $f$  est une fonction continue sur  $[a, b]$ , dérivable sur  $]a, b[$  à valeurs complexes telle que  $f(a) = f(b)$ , on peut appliquer le théorème de Rolle à  $\Re f$  et  $\Im f$  et en déduire que  $f'$  s'annule sur  $]a, b[$ .

### 1 CCINP 3

1. On pose  $g(x) = e^{2x}$  et  $h(x) = \frac{1}{1+x}$ .  
Calculer, pour tout entier naturel  $k$ , la dérivée d'ordre  $k$  des fonctions  $g$  et  $h$  sur leurs ensembles de définitions respectifs.
2. On pose  $f(x) = \frac{e^{2x}}{1+x}$ .  
En utilisant la formule de Leibniz concernant la dérivée  $n^{\text{ième}}$  d'un produit de fonctions, déterminer, pour tout entier naturel  $n$  et pour tout  $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ , la valeur de  $f^{(n)}(x)$ .
3. Démontrer, dans le cas général, la formule de Leibniz, utilisée dans la question précédente.

#### Solution de 1 : CCINP 3

1.  $g$  est de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}$  et  $h$  est de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ .  
On prouve, par récurrence, que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, g^{(k)}(x) = 2^k e^{2x} \text{ et } \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, h^{(k)}(x) = \frac{(-1)^k k!}{(1+x)^{k+1}}.$$

2.  $g$  et  $h$  sont de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$  donc, d'après la formule de Leibniz,  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$  et  $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$  :

$$f^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} g^{(n-k)}(x) h^{(k)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^{n-k} e^{2x} \frac{(-1)^k k!}{(1+x)^{k+1}} = n! e^{2x} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k 2^{n-k}}{(n-k)! (1+x)^{k+1}}.$$

3. Notons  $(P_n)$  la propriété :

Si  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  et  $g : I \rightarrow \mathbb{R}$  sont  $n$  fois dérivables sur  $I$  alors,  $fg$  est  $n$  fois dérivable sur  $I$  et :

$$\forall x \in I, (fg)^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)}(x) g^{(k)}(x).$$

Prouvons que  $(P_n)$  est vraie par récurrence sur  $n$ .

La propriété est vraie pour  $n = 0$  et pour  $n = 1$  (dérivée d'un produit).

Supposons la propriété vraie au rang  $n \geq 0$ .

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  et  $g : I \rightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions  $n + 1$  fois dérivables sur  $I$ .

Les fonctions  $f$  et  $g$  sont, en particulier,  $n$  fois dérivables sur  $I$  et donc par hypothèse de récurrence la

fonction  $fg$  l'est aussi avec  $\forall x \in I, (fg)^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)}(x) g^{(k)}(x)$ .

Pour tout  $k \in \{0, \dots, n\}$ , les fonctions  $f^{(n-k)}$  et  $g^{(k)}$  sont dérivables sur  $I$  donc par opération sur les fonctions dérivables, la fonction  $(fg)^{(n)}$  est encore dérivable sur  $I$ .

Ainsi la fonction  $fg$  est  $(n+1)$  fois dérivable et

$$\forall x \in I, (fg)^{(n+1)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left( f^{(n+1-k)}(x)g^{(k)}(x) + f^{(n-k)}(x)g^{(k+1)}(x) \right).$$

En décomposant la somme en deux et en procédant à un décalage d'indice sur la deuxième somme, on obtient

$$\forall x \in I, (fg)^{(n+1)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n+1-k)}(x)g^{(k)}(x) + \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} f^{(n+1-k)}(x)g^{(k)}(x).$$

C'est-à-dire  $(fg)^{(n+1)}(x) = \sum_{k=0}^{n+1} \left( \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right) f^{(n+1-k)}(x)g^{(k)}(x)$  avec  $\binom{n}{-1} = \binom{n}{n+1} = 0$ .

Or, en utilisant le triangle de Pascal, on a  $\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$ .

On en déduit que  $(fg)^{(n+1)}(x) = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} f^{(n+1-k)}(x)g^{(k)}(x)$ .

Donc  $(P_{n+1})$  est vraie.

## 2 CCINP 4

- Énoncer le théorème des accroissements finis.
- Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  et soit  $x_0 \in ]a, b[$ .  
On suppose que  $f$  est continue sur  $[a, b]$  et que  $f$  est dérivable sur  $]a, x_0[$  et sur  $]x_0, b[$ .  
Démontrer que, si  $f'$  admet une limite finie en  $x_0$ , alors  $f$  est dérivable en  $x_0$  et  $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ .
- Prouver que l'implication : ( $f$  est dérivable en  $x_0$ )  $\implies$  ( $f'$  admet une limite finie en  $x_0$ ) est fautive.

**Indication** : on pourra considérer la fonction  $g$  définie par :  $g(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$  si  $x \neq 0$  et  $g(0) = 0$ .

### Solution de 2 : CCINP 4

- Théorème des accroissements finis :  
Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ .  
On suppose que  $f$  est continue sur  $[a, b]$  et dérivable sur  $]a, b[$ .  
Alors  $\exists c \in ]a, b[$  tel que  $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$ .
- On suppose que  $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$ .  
Soit  $h \neq 0$  tel que  $x_0 + h \in [a, b]$ .  
En appliquant le théorème des accroissements finis, à la fonction  $f$ , entre  $x_0$  et  $x_0 + h$ , on peut affirmer qu'il existe  $c_h$  strictement compris entre  $x_0$  et  $x_0 + h$  tel que  $f(x_0 + h) - f(x_0) = f'(c_h)h$ .  
Quand  $h \rightarrow 0$  (avec  $h \neq 0$ ), on a, par encadrement,  $c_h \rightarrow x_0$ .  
Donc  $\frac{1}{h} (f(x_0 + h) - f(x_0)) = f'(c_h) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} f'(x) = \ell$ .  
On en déduit que  $f$  est dérivable en  $x_0$  et  $f'(x_0) = \ell$ .
- La fonction  $g$  proposée dans l'indication est évidemment dérivable sur  $]-\infty, 0[$  et  $]0, +\infty[$ .  
 $g$  est également dérivable en  $0$  car  $\frac{1}{h} (g(h) - g(0)) = h \sin \left( \frac{1}{h} \right)$ .

Or  $h \sin\left(\frac{1}{h}\right) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$  car  $\left| h \sin\left(\frac{1}{h}\right) \right| \leq |h|$ . Donc,  $g$  est dérivable en 0 et  $g'(0) = 0$ .

Cependant,  $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ,  $g'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ .

$2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$  (car  $\left| 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \right| \leq 2|x|$ ), mais  $x \mapsto \cos\left(\frac{1}{x}\right)$  n'admet pas de limite en 0.  
Donc  $g'$  n'a pas de limite en 0.

**3** Soit  $E$  espace euclidien,  $\|\cdot\|$  la norme euclidienne associée. Si  $f$  définie sur  $I$  intervalle de  $\mathbb{R}$  à valeurs dans  $E$  deux fois dérivable sur  $I$  telle que  $\|f\|$  soit constante, montrer que le produit scalaire  $(f(t)|f''(t))$  est toujours négatif.

Interprétation géométrique ?

**Solution de 3 :**

$g : t \mapsto \|f(t)\|^2 = (f(t)|f(t))$  est deux fois dérivable par opérations, le produit scalaire étant bilinéaire et est constant, donc en dérivant, par symétrie du produit scalaire, pour tout  $t \in I$ ,  $g'(t) = 2(f(t)|f'(t)) = 0$ , puis en redérivant,  $g''(t) = 2(f(t)|f''(t)) + 2\|f'(t)\|^2 = 0$  et donc  $(f(t)|f''(t)) = -\|f'(t)\|^2 \leq 0$ .

Interprétation : un mouvement sur une sphère a une accélération orientée vers l'intérieur de la sphère.

**4** Très classique (jusqu'à 4.)

1. Donner une condition nécessaire et suffisante sur les racines d'un polynôme pour qu'il soit scindé à racines simples.
2. Soit  $P \in \mathbb{R}[X]$  scindé simple avec  $\deg P \geq 2$ . Montrer que  $P'$  est scindé simple.
3. Est-ce encore vrai sur  $\mathbb{C}[X]$  ?
4. Soit  $P \in \mathbb{R}[X]$  scindé avec  $\deg P \geq 2$ . Montrer que  $P'$  est scindé.
5. Avec les mêmes hypothèses montrer que plus généralement, si  $(a, b) \neq (0, 0)$ ,  $aP + bP'$  est scindé.

**Solution de 4 : Très classique (jusqu'à 4.)**

5. Le résultat est immédiat si  $a = 0$  ou  $b = 0$ . On suppose donc  $a \neq 0$  et  $b \neq 0$ .

Sinon, sans perte de généralité, on peut supposer que  $b = 1$  (quitte à tout diviser par  $b$ ).

Si  $P$  est scindé, il s'écrit  $P = \lambda \prod_{k=1}^n (X - x_k)^{m_k}$  avec  $x_1 < \dots < x_n$  et comme dans la question précédente, chaque  $x_k$  est racine de  $P'$  de multiplicité  $m_k - 1$ , ce qui donne  $\deg P - n$  racines de  $aP + P'$  comptées avec multiplicité. Il en manque encore  $n$ .

L'idée astucieuse est de considérer  $f : x \mapsto P(x)e^{ax}$  qui se dérive en  $f' : x \mapsto (P'(x) + aP(x))e^{ax}$  possédant les mêmes zéros que  $P' + aP$ .

Or  $f$  s'annule en tous les  $x_k$  et possède une limite nulle soit en  $+\infty$ , soit en  $-\infty$ . En appliquant  $n$  fois le théorème de Rolle (éventuellement généralisé), on obtient  $n$  zéros distincts et distincts des  $x_k$  de  $f'$  donc les  $n$  racines qu'il nous manquait de  $P' + aP$  qui est bien scindé.

**5** Montrer que  $((X^2 - 1)^n)^{(m)}$  est scindé à racines simples toutes dans  $] -1, 1[$ .

**6** Généralisations du théorème de Rolle

1. Soit  $f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$  dérivable et admettant une même limite (finie ou non) en  $\pm\infty$ . Montrer qu'il existe un réel  $c$  tel que  $f'(c) = 0$ .

2. Soient  $a \in \mathbb{R}$  et  $f$  continue sur  $[a, +\infty[$ , dérivable sur  $]a, +\infty[$  telle que  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} f(a)$ . Montrer qu'il existe  $c \in ]a, +\infty[$  tel que  $f'(c) = 0$ .

## 7 Dérivées successives d'arctangente

Montrer que pour tout  $n \geq 1$ ,  $\text{Arctan}^{(n)} : x \mapsto \frac{P_n(x)}{(1+x^2)^n}$  où  $P_n$  est une fonction polynomiale scindée simple.

## 8 Théorème de Darboux Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable.

1. On suppose que  $f'(a)$  et  $f'(b)$  sont de signe contraire. Démontrer que  $f'$  s'annule sur  $]a, b[$ .
2. En déduire que la dérivée d'une fonction dérivable possède la propriété des valeurs intermédiaires.

### Solution de 8 : Théorème de Darboux

1. On suppose, sans perte de généralités, que  $f'(a) > 0$  et  $f'(b) < 0$ . On aimerait adapter la preuve du théorème de Rolle en disant que le maximum que  $f$  atteint en étant continue sur le segment  $[a, b]$  est atteint dans  $]a, b[$  mais on ne peut pas le dire directement car  $f'$  n'est pas supposée continue donc on ne peut pas conclure de l'hypothèse car  $f$  est strictement croissante au voisinage de  $a$  et strictement décroissante au voisinage de  $b$ .

Cependant,  $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \xrightarrow{x \rightarrow a^+} f'(a) > 0$  donc au voisinage de  $a$ ,  $f(x) - f(a) > 0$  soit  $f(x) > f(a)$  et de même, au voisinage de  $b$ ,  $f(x) > f(b)$  ce qui assure que ce maximum est atteint dans  $]a, b[$ . La condition nécessaire d'extremum local permet bien de conclure.

2. Si, plus généralement,  $f$  dérivable sur  $I$ ,  $a, b \in I$  distincts et  $m$  tel que  $f'(a) < m < f'(b)$ , alors  $g = f - m \text{id}$  est dérivable sur  $[a, b]$  et la première question nous dit que  $g'$  s'annule donc que  $m$  est atteinte par  $f'$  sur  $]a, b[$ .

## 9 On se propose de démontrer l'inégalité des accroissements finis dans le cas complexe où $f$ est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ , telle que $|f'| \leq k$ sur $]a, b[$ .

Pour cela, on considère  $\varphi : \begin{cases} [a, b] & \rightarrow \mathbb{R} \\ t & \mapsto \Re \left( \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \overline{f(t)} \right) \end{cases}$ .

Conclure en appliquant l'inégalité des accroissements finis réelle à  $\varphi$ .

## 10 Erreur dans l'interpolation de Lagrange

Soit  $P_n$  polynôme d'interpolation de Lagrange interpolant une fonction  $f$  de classe  $\mathcal{C}^{n+1}$  aux points  $(x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b)$ .

1. Montrer que

$$\forall x \in [a, b], \exists \xi_x \in [a, b], f(x) - P_n(x) = \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_n)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi_x).$$

*Indication : s'inspirer de la démonstration du théorème des accroissements finis.*

2. En déduire, si l'on note  $M_{n+1}(f) = \|f^{(n+1)}\|_\infty$  et  $T(x) = (x - x_0) \cdots (x - x_n)$ ,

$$\|f - P_n\|_\infty \leq \frac{M_{n+1}(f)}{(n+1)!} \|T\|_\infty.$$

### Solution de 10 : Erreur dans l'interpolation de Lagrange

Soit  $x \in [a, b]$ , distinct des  $x_i$  (sinon, c'est immédiat, tous les  $\xi_x$  conviennent.).

Soit  $\varphi : t \mapsto f(t) - P_n(t) - KT(t)$  où  $K$  est tel que  $\varphi(x) = 0$  (ce qui est possible car  $T(x) \neq 0$  car  $x$  n'est pas l'un des  $x_i$ .)

On a alors que  $\varphi$  est nulle en  $x$  et en tous les  $x_i$ , soit en  $n+2$  points. Comme les fonctions qui la composent sont de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[a, b]$ ,  $\varphi$  est continue sur les segments et dérivable sur les  $n+1$  intervalles ouverts successifs d'extrémités ces points, ce qui nous donne  $n+1$  zéros distincts (dans  $]a, b[$ ) de  $\varphi'$  en appliquant  $n+1$  fois le théorème de Rolle.

En répétant ce procédé à  $\varphi'$ , puis  $\varphi''$ , etc jusqu'à  $\varphi^{(n)}$ , ce qui est possible car  $f$  donc  $\varphi$  est de classe  $\mathcal{C}^{n+1}$ , on obtient par récurrence que pour tout  $j \in \llbracket 0, n+1 \rrbracket$ ,  $\varphi^{(j)}$  admet  $n+2-j$  zéros distincts (dans  $]0, n[$ ). En particulier,  $\varphi^{(n+1)}$  s'annule en un  $\xi_x \in ]a, b[$ .

Or  $\varphi^{(n+1)} = f^{(n+1)} - P_n^{(n+1)} - KT^{(n+1)}(t) = f^{(n+1)} - K(n+1)!$  car  $P_n$  est de degré au plus  $n$  et  $T$  est unitaire de degré  $n+1$ .

On a donc finalement que  $K = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}$  et donc

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} T(x).$$

## 11 Égalité de Taylor-Lagrange

Soit  $f$  de classe  $\mathcal{C}^{(n+1)}$  sur  $I$ ,  $a, b \in I$ . Montrer qu'il existe  $c \in ]a, b[$  tel que

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}.$$

### Solution de 11 : Égalité de Taylor-Lagrange

Poser  $\varphi(x) = f(b) - \left( f(x) + f'(x)(b-x) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x)}{n!}(b-x)^n + A(b-x)^{n+1} \right)$  avec  $A$  tel que  $\varphi(a) = 0$  et appliquer le théorème de Rolle puis conclure.

Ou bien poser  $\varphi(x) = f(x) - \left( f(a) + f'(a)(x-a) + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + A(x-a)^{n+1} \right)$  avec  $A$  tel que  $\varphi(b) = 0$  et soit appliquer le théorème de Rolle puis une hypothèse de récurrence, soit  $n$  fois le théorème de Rolle.

12 Le but de l'exercice est de construire des fonction « plateau » de classe  $\mathcal{C}^\infty$  nulles hors d'un segment  $[a, b]$  et valant 1 sur un segment inclus dans  $]a, b[$ .

1. On définit, si  $x > 0$ ,  $\phi(x) = \exp(-1/x)$ . Montrer que  $\phi$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $]0, +\infty[$  et que sa dérivée  $k^e$  est de la forme  $x \mapsto P_k(1/x) \exp(-1/x)$  où  $P_k$  polynomiale.  
On prolonge  $\phi$  à  $\mathbb{R}$  en définissant, si  $x \leq 0$ ,  $\phi(x) = 0$ .  
Montrer que  $\phi$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$ .  
Tracer l'allure du graphe de  $\phi$ .
2. Tracer l'allure du graphe de  $x \mapsto \phi(x+2)\phi(-1-x)$  puis de son unique primitive qui tends vers 0 en  $-\infty$ .
3. Construire  $\psi$  de classe  $\mathcal{C}^\infty$ , nulle en dehors de  $[-2, 2]$  et valant 1 sur  $[-1, 1]$ .
4. Si  $a < b < c < d$ , comment construire une fonction  $\mathcal{C}^\infty$ , nulle en dehors de  $[a, b]$  et valant 1 sur  $[c, d]$ ?